

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かぜの諸症状の緩和に

こうそさん

香蘇散配合

カゼンエス

非ピリン系
かぜ薬顆粒

●特徴●

- 胃腸が弱い人の「かぜ」に古くから用いられている「香蘇散」を配合しています。
- 6つの成分がはたらいて「かぜ」による、発熱、せき、鼻水、痛みなどの諸症状を緩和します。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフル
 - 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 エンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなツブツブ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果■

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

■用法・用量■

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満の小児	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- 1本剤は用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量3包(成人の1日服用量)中■〔1包量1500mg〕

成 分	分量	主な作用
アセトアミノフェン	540mg	「かぜ」による発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みに効果をあらわします。
エテンザミド	600mg	せきの中樞に働いて、せきをしずめます。
ノスカピン	30mg	「かぜ」のひきはじめにみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに効果をあらわします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	脳内の血管に働いて「かぜ」による頭痛をしずめます。
無水カフェイン	120mg	
香蘇散 コウブシ末 800mg ソウウ末 400mg チンピ末 600mg ショウキョウ末 200mg カンゾウ末 200mg の混合粉末	2200mg	胃腸の弱い人の「かぜ」に古くから用いられ悪寒、頭痛などに効果があります。

添加物として、乳糖、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、デヒドロ酢酸Na、その他2成分を含有する。

■保管及び取扱い上の注意■

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 1包を分割して服用した残りを使用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限のすぎた製品は使用しないでください。

